



برنامه تغذیه برنج

برنامه تغذیه مزارع برنج

زمان مصرف	نوع کود	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف
قبل از کاشت	ماکرو گرانوله جی ار		مخلوط با خاک	۳۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
	فسفات آلی گوگردی	آلی گوگردی		۳۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
زمان انتقال نشاء	سیوید		غوطه ور کردن ریشه ها	محلول ۴-۳ درصد
پس از انتقال نشاء به زمین	TE+۱۳-۴۰-۱۳		آب آبیاری	۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار
پنجه زنی	TE+۲۶-۱۲-۱۲		محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هکتار
ساقه دهی	اسید هیومیک سوپرپلاس	اسید هیومیک معمولی	آب آبیاری	۱۰ لیتر در هکتار
	TE+۲۰-۲۰-۲۰		محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هکتار
	سیلیکات پتاسیم	سولفات پتاسیم (آب آبیاری)		۲-۳ لیتر در هکتار
قبل از ظهور خوشه	TE+۱۲-۱۲-۳۷		محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هکتار
	روی ۱۰ درصد	آمینومیکرومیکس		۲-۳ لیتر در هکتار
رسیدگی	پتاس ۴۲ درصد		محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار