

## برنامه تغذیه باغات سیب

برنامه تغذیه باغات سیب

| زمان مصرف            | نوع کود           | نحوه مصرف  | میزان مصرف                        |
|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| قبل از فعالیت گیاه   | ماکرو جی آر       | چالکود     | بسته به سن درخت ۲-۳ کیلوگرم/ درخت |
|                      | آلی گوگردی        |            | بسته به سن درخت ۲-۳ کیلوگرم/ درخت |
| تورم جوانه           | فروت ست           | محلول پاشی | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب          |
|                      | سیوید             |            | ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب          |
| بعد از ریزش گلبرگ‌ها | اسید هیومیک       | آب آبیاری  | ۱۰-۱۵ لیتر در هکتار               |
|                      | TE+۲۰-۲۰-۲۰       | محلول پاشی | ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب         |
|                      | آمینومیکرومیکس    |            | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب          |
|                      | نیتрат کلسیم      |            | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب          |
| یک هفته بعد          | شروع توسعه میوه   | محلول پاشی | ۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب         |
| یک هفته بعد          | نیترات کلسیم      |            | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب          |
| زمان رنگ آوری میوه   | پتاس مایع ۴۲ درصد | محلول پاشی | ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب          |
|                      | آمینومیکرومیکس    |            | ۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب          |
| پس از برداشت         | فروت ست           | محلول پاشی | ۲ لیتر در هزار لیتر آب            |

واحد فنی شرکت آتیه سازان ماهنشان