

برنامه تغذیه مزارع سویا

زمان مصرف	نوع کود مصرفی	روش مصرف	مقدار
قبل از کشت	فسفات آلی گوگردی	مخلوط با خاک	۳۰۰ - ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
۵-۶ برگگی	۱۳-۴۰-۱۳	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۱۰ کیلوگرم در هکتار
	اسید هیومیک		۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
رشد رویشی (۸ برگگی)	۲۰-۲۰-۲۰ فلورامین	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۱۵ کیلوگرم در هکتار
	اسید هیومیک		۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
یک هفته بعد	نترات کلسیم	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار
قبل از گلدهی	سیوید	محلول پاشی	۲ لیتر در هکتار
	TE+۲۰-۲۰-۲۰		۵ کیلوگرم در هکتار
بعد از تشکیل غلاف	۱۲-۱۲-۳۷	محلول پاشی آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۵ کیلوگرم در هکتار
	اسید هیومیک		۱۰-۱۵ لیتر در هکتار
همزمان با پر شدن دانه	پتاس مایع	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هکتار
قبل از خمیری شدن دانه ها	سولفات پتاسیم	آب آبیاری (در ساعات پایان آبیاری)	۱۵ کیلوگرم در هکتار