

برنامه تغذیه مرکبات

تغذیه مرکبات

زمان مصرف	نوع کود	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف
قبل از فعالیت گیاه	ماکرو جی ار	ماکرو هیومیکی	چالکود	بسته به سن درخت ۱-۳ کیلوگرم/ درخت
	پتاس گوگردی	آلی گوگردی		بسته به سن درخت ۱-۲ کیلوگرم/ درخت
تورم جوانه	فروت ست فلورا	روی ۱۰ درصد ، بر ۱۰ درصد	محلول پاشی	۲ لیتر در هزار لیتر آب
	سیوید			۱ لیتر در هزار لیتر آب
ریزش کامل گلبرگ‌ها	اسید هیومیک سوپرپلاس	اسید هیومیک معمولی	آب آبیاری	۱۰ لیتر در هکتار
	TE+۲۰-۲۰-۲۰		محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب
	آمینومیکرومیکس			۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
پر شدن میوه (۷-۱۰ هفته قبل از برداشت)	اسید هیومیک سوپرپلاس	اسید هیومیک معمولی	آب آبیاری	۱۰ لیتر در هکتار
	TE+۱۲-۱۲-۳۷		محلول پاشی	۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب
	نیتрат کلسیم			۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
بلوغ و رسیدن میوه (۳-۵ هفته قبل از برداشت)	پتاسیم ۴۲ درصد	سولفات پتاسیم (آب آبیاری: ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار)	محلول پاشی	۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
	نیترات کلسیم			۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
پس از برداشت	فروت ست	روی ۱۰ درصد ، بور ۱۰ درصد	محلول پاشی	۲ لیتر در هزار لیتر آب